

**TABLEAU DE DETERMINATION DES PRINCIPALES GRAMINEES PRAIRIALES AU STADE VÉGÉTATIF
Alain Peeters (2003)**

Limbe très étroit, en forme d'aiguille	Limbe large			
	Préfoliation pliée		Préfoliation enroulée	
	Côtes bien visibles	Côtes peu apparentes	Présence d'oreillettes	Pas d'oreillettes
<p><i>Fétuque rouge</i> : limbes raides, verts foncés, à côtes bien visibles ; limbes insérés sur la tige, larges ; limbes de la base, étroits, en aiguille ; ligule très courte, quasiment invisible ; oreillettes absentes ou réduites à de très courtes excroissances.</p>	<p><i>Ray-grass anglais</i> : plante peut former de grosses touffes ; côté inférieur du limbe très brillant ; ligule courte, membraneuse ou verdâtre ; le plus souvent petites oreillettes ; piéd rouge.</p> <p><i>Crételle</i> : plante très semblable à la précédente mais souvent fleurie, jamais en grosses touffes ; jamais d'oreillettes ; piéd jaune-brun.</p>	<p><i>Dactyle</i> : plante vigoureuse ; tige très comprimée à la base ; limbe mat, souvent fortement caréné ; ligule longue et souvent déchirée.</p> <p><i>Pâturin annuel</i> : plante basse ; limbe vert-jaune, souvent plié en accordéon, souvent caréné ; ligule longue, laiteuse.</p> <p><i>Pâturin des prés</i> : plante variable ; limbe vert-foncé à forte carène ; ligule très courte, tronquée ; présence de rhizomes.</p> <p><i>Pâturin commun</i> : plante variable ; limbe vert-clair, à sommet en pointe, jamais de carène ; ligule triangulaire courte ou longue.</p>	<p>* <u>Côté inférieur du limbe brillant</u></p> <p><i>Fétuque des prés</i> : moins de 16 côtes bien visibles sur la face supérieure du limbe ; oreillettes larges et longues ; ligule très courte, nettement moins haute que la base décolorée des limbes ; piéd rouge.</p> <p><i>Ray-grass italien</i> : très semblable à la précédente ; port plus dressé ; épi très différent ; plus de 16 côtes bien visibles sur la face supérieure du limbe ; ligule courte, aussi haute que la base décolorée du limbe ; piéd rouge.</p> <p><i>Fétuque élevée</i> : plante plus vigoureuse que les deux précédentes ; limbe plus raide ; très souvent présence de poils sur les oreillettes ; piéd rouge.</p> <p>* <u>Limbe mat</u></p> <p><i>Chiendent</i> : limbe poilu ou rêche ; gaine poilue ; ligule courte ; oreillettes longues et étroites, souvent embrassant la tige ; présence de rhizomes.</p>	<p>* <u>Présence de poils</u></p> <p><i>Houlque laineuse</i> : plante entièrement poilue, douce au toucher, souvent en grosses touffes ; ligule longue et blanche ; nervures rouge-violettes sur les gaines de la base.</p> <p><i>Brome mou</i> : plante entièrement poilue, souvent fleurie, jamais en grosses touffes ; ligule très courte, blanc sale ; gaines s'ouvrant en V ; pas de nervures rouge-violettes sur les gaines de la base.</p> <p><i>Fromental</i> : plante généralement peu poilue ; même si peu de poils sur le limbe, souvent 2 poils au sommet ; limbe souvent rétréci au 2/3 de sa hauteur et montrant des lignes de lumière par transparence ; ligule blanche, grossièrement dentée ; pas de nervures rouge-violettes sur les gaines de la base.</p> <p>* <u>Pas de poils</u></p> <p><i>Fléole</i> : limbe mat ; ligule blanche, grande, dentée ; tige robuste, dressée, souvent renflée en bulbe à la base ; racine blanche.</p> <p><i>Fromental</i> : plante très peu poilue, mais souvent 2 poils au sommet du limbe ; limbe mat, souvent rétréci au 2/3 de la hauteur et montrant des lignes de lumière par transparence ; ligule blanche, moyenne, grossièrement dentée ; tige assez grêle ; racine jaune.</p> <p><i>Vulpin des prés</i> : côtes secondaires bien marquées et irrégulières sur la face supérieure du limbe ; côté inférieur du limbe souvent brillant ; ligule courte, souvent implantée en oblique ; tige robuste, dressée ; présence de rhizomes.</p> <p><i>Agrostide stolonifère</i> : plante rampante ; tige grêle ; ligule symétrique, bien développée, blanc sale.</p> <p><i>Agrostide commun</i> : plante couchée, parfois stolonifère, souvent fleurie ; tige grêle ; ligule très courte, asymétrique.</p>