

Clé de détermination de quelques graminées au stade végétatif

Limbe très étroit en forme d'aiguille (au moins celles de la base)	Limbe large						
	Préfoliation pliée		Présence d'oreillettes	Préfoliation enroulée			
	Côtes bien visibles (face supérieure du limbe)	Côtes peu apparentes (face supérieure du limbe)		Pas d'oreillette		Pas de poils, côtes faibles	
			Présence de poils	Pas de poils, côtes modérées à fortes			
<p>1. Fétuque rouge : <i>Festuca rubra</i> Limbe raide, vert foncé, inséré sur la tige, étroit, à côtes bien visibles ; limbe de la base, étroit, en aiguille ; limbe fermé, souvent velu (non visible à l'œil nu) ; ligule très courte, quasiment invisible ; oreillettes absentes ou réduites à de très courtes excroissances ; plante cespiteuse ; parfois présence de rhizomes.</p> <p>2. Fétuque ovine : <i>Festuca ovina</i> Limbe raide, bleu-vert, ouvert aux 3/4 au plus ; ligule très courte, oreillettes très réduites ; cespiteuse.</p> <p>3. Nard raide : <i>Nardus stricta</i> Limbe raide et dur, gris-vert, tiges dressées, ligule blanche, courte mais visible, pas d'oreillette ; feuilles souvent perpendiculaires à la tige. Cespiteuse ; rhizomes courts.</p> <p>4. Canche flexueuse : <i>Deschampsia flexuosa</i> Plante cespiteuse, à courts rhizomes, glabre ; limbe vert foncé, très fin, raide, lisse ; ligule courte, tronquée ; tige dressée, souvent rosées à la base ; panicule lâche à rameux flexueux.</p> <p>Autres cas : Formes atypiques et rares de <i>Deschampsia caespitosa</i> ou de <i>Poa pratensis</i>.</p>	<p>5. Ray-grass anglais : <i>Lolium perenne</i> Plante cespiteuse ; face inférieure du limbe très brillante ; souvent petites oreillettes (+ grandes chez le 4n) ; ligule courte, membraneuse ou verdâtre ; ped rouge (base de la gaine) ; nervure centrale bien marquée.</p> <p>6. Crételle : <i>Cynosurus cristatus</i> Plante souvent fleurie, jamais en grosses touffes ; face inférieure brillante ; ligule courte à moyenne ; pas d'oreillette ; feuille souvent rétrécie au 2/3 du limbe ; pied souvent jaune-brun ; inflorescence en forme de "brosse à dents".</p> <p>7. Canche cespiteuse : <i>Deschampsia caespitosa</i> Limbe rude, fortement nervuré, tranchant, à lignes blanches à transparentes ; ligule longue, pointue, blanche ; cespiteuse.</p> <p>8. Glycérie flottante : <i>Glyceria fluitans</i> Limbe avec « trace de ski » ; nervures transversales visibles par transparence ; port plutôt couché ; plante à rhizomes, ligule longue, transparente, à sommet aigu ou arrondi, souvent déchirée ; gaines carénées ou très aplaties ; Pas d'oreillette.</p> <p>Autre cas : Forme rare et atypique de <i>Festuca rubra</i>.</p>	<p>9. Glycérie aquatique : <i>Glyceria maxima</i> Tige dressée ; ligule courte, blanc sale, raide, tronquée et se terminant en pointe (accolade renversée) ; limbe large, sillon central ; Pas d'oreillette ; cespiteuse.</p> <p>10. Dactyle : <i>Dactylis glomerata</i> Plante vigoureuse, en touffes, tige très comprimée à la base (stade jeune) ; limbe mat, vert-bleuté, souvent fortement caréné ; ligule longue et souvent déchirée.</p> <p>Pâturin # RGA Jamais d'oreillettes ; « traces de ski » sur la face supérieure de la feuille.</p> <p>11. Pâturin annuel : <i>Poa annua</i> Plante basse, port étalé ; limbe vert-jaune, souvent plié en accordéon, souvent caréné (coque de bateau) ; ligule longue, laiteuse ; presque toujours en fleur, inflorescence sur 1 seul axe.</p> <p>12. Pâturin des prés : <i>Poa pratensis</i> Plante variable ; limbe vert-foncé, assez raide, à forte carène ; ligule blanche, très courte ou tronquée ; gaine parfois finement velue, présence de rhizomes, "ped de biche".</p> <p>13. Pâturin commun : <i>Poa trivialis</i> Plante variable ; limbe vert-clair, tendre, fin, à face inférieure luisante, à sommet en pointe, peu caréné ; ligule triangulaire, courte ou assez longue et pointue, translucide ; présence de stolons.</p>	<p>14. Ray-grass italien : <i>Lolium multiflorum</i> Port dressé, oreillettes très embrassantes ; ligule courte, mais aussi haute que la base décolorée du limbe ; ped rouge ; face inférieure du limbe très brillante ; inflorescence : épi d'épillets avec arêtes.</p> <p>15. Fétuque des prés : <i>Festuca pratensis</i> Plante en touffe ; face inférieure du limbe très brillante ; oreillettes longues et larges ; ligule très courte, nettement moins longue que la base décolorée du limbe ; ped rouge ; dernière feuille souvent attachée à angle droit sur la tige ; inflorescence : panicule étalée.</p> <p>16. Fétuque élevée : <i>Festuca arundinacea</i> Plante vigoureuse ; limbe plus raide ; grandes oreillettes avec très souvent présence de quelques poils (parfois peu visibles) ; ligule courte, moins haute que la base décolorée des limbes ; ped rouge.</p> <p>17. Chiendent : <i>Elymus repens</i> Limbe glabre ou velu, mais toujours rêche ; gaine inférieure souvent poilue ; ligule courte ; oreillettes fines et longues, souvent embrassante ; présence de rhizomes ; inflorescence en "pas de canard".</p> <p>18. Orge faux-seigle : <i>Hordeum secalinum</i> Plante cespiteuse, légèrement velue ; tige dressée ; limbe étroit, parfois velu ; gaine toujours velue ; ligule courte, tronquée ; oreillettes très fines.</p> <p>Autre cas : Forme d'<i>Anthoxanthum odoratum</i> avec oreillette clairement ciliées.</p>	<p>19. Flouve odorante : <i>Anthoxanthum odoratum</i> Plante peu poilue, mais touffes de longs poils à la jonction du limbe et de la gaine ; ligule variable, souvent courte, peu visible ou parfois petites oreillettes ciliées avec ligule moyenne à longue, translucide, plus ou moins tronquée ; forte odeur de coumarine.</p> <p>Houlque laineuse : gaine fendue Brome : gaine soudée</p> <p>20. Houlque laineuse : <i>Holcus lanatus</i> Plante entièrement velue (limbe et gaine), molle, douce au toucher ; bord du limbe poilu ; souvent en grosses touffes ; ligule longue, blanche, tronquée et bien denticulée ; nervures rouges-violettes sur gaine de la base (pyjama) ; pré de fauche tardive : épiaison tardive.</p> <p>21. Brome mou : <i>Bromus hordeaceus</i> Plante entièrement velue, poils concentrés au niveau des nœuds, jamais en grosses touffes ; gaines à bords soudés s'ouvrant en V ; ligule assez courte, blanc sale, denticulée ; pas de nervures rouge-violettes sur gaines de la base, mais parfois des stries brun-rouge sur les gaines ; inflorescence en épillets avec arêtes ; épiaison précoce.</p> <p>22. Molinie bleue : <i>Molinia caerulea</i> Tige dressée, raide, avec un seul nœud, base rose-violacée ; limbe large, raide, avec quelques poils ; couronne de poils à la place de la ligule.</p>	<p>23. Avoine dorée : <i>Trisetum flavescens</i> Plante dressée, poilue (sauf rares exceptions), peu feuillue, vert-jaune à jaune, cespiteuse avec de courts rhizomes ; poils des gaines obliques et dirigés vers le bas ; côtes visibles (+ 10, svt 14) ; ligule courte et dentée.</p> <p>24. Houlque molle : <i>Holcus mollis</i> Plante velue (moins que lanatus), à rhizomes ; tige dressée ; limbe large, à pilosité plus importante sur le haut et sans poils plus bas, à bord non velu, vert-gris ; nœuds avec beaucoup de poils, souvent dirigés vers le bas ; gaines inférieures avec de fines nervures violettes ; ligule longue, blanche, dentée.</p> <p>25. Koelérie pyramidale : <i>Koeleria pyramidata</i> Plante cespiteuse, légèrement poilue ; tige dressée ; limbe étroit, court, rugueux au dessus, lisse en dessous, glabre ou poilu des deux côtés, bord cilié ; ligule courte, tronquée.</p> <p>26. Brome cathartique <i>Bromus catharticus</i> Plante robuste, dressée ; limbe large ; gaines couvertes de fins poils ; ligule longue, tronquée, légèrement dentée.</p> <p>27. Brome d'Alaska <i>Bromus sitchensis</i> Plante robuste, tige dressée ; gaine glabre ou légèrement poilue, poils bien visibles juste en dessous de l'intersection du limbe et la gaine ; limbe large, plat, glabre ou légèrement poilu sur la face inférieure ; ligule longue, blanchâtre, dentée.</p> <p>Autre cas : Forme poilue d'<i>Arrhenatherum elatius</i>.</p>	<p>28. Agrostide stolonifère : <i>Agrostis stolonifera</i> Plante rampante, limbe vert foncé, fin ; ligule symétrique, bien développée, plus longue que large, ± arrondie au sommet, blanc sale ; tige parfois rougeâtres ; présence de longs stolons.</p> <p>29. Agrostide commune : <i>Agrostis capillaris</i> Plante couchée, parfois stolonifère ; limbe mat, gris-bleu, étroit ; ligule courte, tronquée, asymétrique (sommet de la ligule décentré).</p> <p>30. Agrostide des chiens : <i>Agrostis canina</i> Plante couchée, parfois stolonifère, jamais de rhizome ; tige très fine ; côtes plus marquées que <i>A. stolonifera</i> et <i>A. capillaris</i> ; limbe étroit, fin, vert pâle à gris-vert ; ligule longue, pointue, en forme de canine.</p> <p>31. Vulpin genouillé : <i>Alopecurus geniculatus</i> Plante stolonifère ; tige rampante, s'enracine au nœud puis se redresse, tige coudée ; limbe large, court, vert à gris vert, nervure marquée ; ligule très longue, arrondie ; gaines des feuilles supérieures légèrement enflées.</p> <p>35. Amourette commune : <i>Briza media</i> Plante cespiteuse, courts stolons ; limbe large, rugueux, légèrement denté ; ligule courte, arrondie ou tronquée au sommet ; sommet de la feuille souvent desséché.</p>	<p>32. Fromental : <i>Arrhenatherum elatius</i> Limbe mat (aspect d'une fléole au stade jeune), mais parfois légère pilosité sur sa face supérieure, parfois aussi sur les nœuds, souvent rétréci au 2/3 de la hauteur et montrant des lignes de lumière par transparence ; ligule blanche, moyenne, grossièrement dentée ; tige assez grêle ; racine jaune-orange.</p> <p>Fléole : ligule longue, blanche Vulpin des prés : ligule courte, transparente</p> <p>33. Fléole des prés : <i>Phleum pratense</i> Limbe mat, ondulé, vert gris-bleuté ; plante cespiteuse ; ligule longue, blanche, denticulée avec souvent 2 petites pointes aux extrémités ; tige robuste, dressée, souvent renflée en bulbe à la base, racine blanche ; 2 arêtes par épillets ; épiaison tardive.</p> <p>34. Vulpin des prés : <i>Alopecurus pratensis</i> Limbe large ; côtes secondaires bien marquées et irrégulières sur la face supérieure du limbe ; dernière feuille souvent enroulée ; côté inférieur du limbe souvent brillant ; ligule courte à moyenne, translucide, tronquée ; tige robuste, dressée, pied brun chocolat ; présence de rhizomes courts ; épillets à une seule arête ; épiaison (très) précoce.</p> <p>36. Baldingère <i>Phalaris arundinacea</i> Plante robuste, grande, à rhizome ; limbe large, finement nervuré, presque lisse, vert pâle ; ligule longue.</p>